
IUT1 Grenoble
Université Grenoble Alpes



Mathématiques des transmissions Ressource R114

Cyrille SICLET, cyrille.siclet@univ-grenoble-alpes.fr
Bruno TISSERAND, bruno.tisserand@univ-grenoble-alpes.fr
Clara CHATEIGNER, clara.chateigner@univ-grenoble-alpes.fr

Version 2026

Table des matières

1 Trigonométrie **2**
1.1 Fonctions trigonométriques et trigonométriques réciproques . . . 2
1.2 Formules de trigonométrie . . . 6
1.3 Forme polaire $A\cos(\omega t+\varphi)$ . . . 8

2 Fonctions puissances, logarithmes et exponentielles **10**
2.1 Logarithmes . . . 10
2.2 Exponentielles . . . 13
2.3 Monômes de puissances réelles . . . 15
2.4 Racines n-ièmes . . . 15

3 Les nombres complexes **17**
3.1 Un peu d'histoire . . . 17
3.2 Algèbre des nombres complexes . . . 17
3.3 Forme polaire d'un nombre complexe . . . 19
3.4 Application à la géométrie : transformations du plan et lieu géométrique . . . 23
3.5 Application à la trigonométrie . . . 28
3.6 Racines complexes . . . 29
3.7 Application à l'électricité . . . 31

1 Trigonométrie

1.1 Fonctions trigonométriques et trigonométriques réciproques

1.1.1 Fonctions sinus et arc sinus




Figure 1 – Graphe du sin, du sin restreint et de arcsin.

.

Définition 1 (Fonction arcsin)**.** arcsin (ou asin) est la fonction définie dans $[-1;1]$ et à valeurs dans $[-\pi/2;\pi/2]$ qui à tout x associe l'angle θ dont le sin vaut x ($\sin(\theta) = x$). C'est la fonction réciproque de la fonction sin lorsque son domaine de définition est restreint à $[-\pi/2;\pi/2]$. Son graphe est donné figure 1.

T.7 **Remarque** : Dire que $x = \sin(\theta)$ et $\theta = \arcsin(x)$ est équivalent lorsque $x \in [-1;1]$ et $\theta \in [-\pi/2;\pi/2]$

Angle θ	0	$\frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{\pi}{2}$ (90°)
$\sin(\theta)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Table 1 – Sinus remarquables.

x	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\arcsin(x)$	0	$\frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{\pi}{2}$ (90°)

Table 2 – Arcs sinus remarquables.

T.8

Exercice 1. *Autour de* $\arcsin(\sin(\theta))$:
Donner les valeurs des expressions suivantes :

1. $\arcsin(\sin(\pi))$
2. $\arcsin(\sin(\frac{3\pi}{2}))$
3. $\arcsin(\sin(\frac{11\pi}{6}))$
4. $\arcsin(\sin(-\frac{7\pi}{4}))$
5. $\arcsin(\sin(7\pi+1))$
6. $\arcsin(\sin(\frac{9\pi}{2}-1))$
7. $\arcsin(\sin(\frac{7\pi}{4}+\frac{1}{2}))$
8. $\arcsin(\sin(\frac{9\pi}{4}-\frac{1}{4}))$
9. $\arcsin(\sin(\frac{1}{8}-\frac{5\pi}{4}))$

□

Exercice 2. arcsin(sin(θ)) *: cas général* :

1. Soit $k \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in [-\frac{\pi}{2} + 2k\pi; \frac{\pi}{2} + 2k\pi]$. Que vaut arcsin(sin(θ)) ?
2. Soit $k \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in [-\frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi; \frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi]$. Que vaut arcsin(sin(θ)) ?
3. Soit $k \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in [-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi]$. Que vaut arcsin(sin(θ)) ?

□ T.9

Exercice 3. *Autour de* arcsin(cos(θ)) :

Donner les valeurs des expressions suivantes :

1. $\arcsin(\cos(\pi))$
2. $\arcsin(\cos(\frac{3\pi}{2}))$
3. $\arcsin(\cos(\frac{11\pi}{6}))$
4. $\arcsin(\cos(-\frac{7\pi}{4}))$
5. $\arcsin(\cos(7\pi + 1))$
6. $\arcsin(\cos(\frac{9\pi}{2} - 1))$
7. $\arcsin(\cos(\frac{7\pi}{4} + \frac{1}{2}))$
8. $\arcsin(\cos(\frac{9\pi}{4} - \frac{1}{4}))$
9. $\arcsin(\cos(\frac{1}{8} - \frac{5\pi}{4}))$

□

Exercice 4. arcsin(cos(θ)) *: cas général* :

1. Soit $k \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in [2k\pi; \pi + 2k\pi]$. Que vaut arcsin(cos(θ)) ?
2. Soit $k \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in [(2k+1)\pi; \pi + (2k+1)\pi]$. Que vaut arcsin(cos(θ)) ?
3. Soit $k \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in [k\pi; \pi + k\pi]$. Que vaut arcsin(cos(θ)) ?

□ T.10

Exercice 5. *Autour de* cos(arcsin(x)) :

Donner les valeurs des expressions suivantes :

1. $\cos(\arcsin(0))$
2. $\cos(\arcsin(1))$
3. $\cos(\arcsin(-1))$
4. $\cos(\arcsin(-\frac{1}{2}))$
5. $\cos(\arcsin(\frac{\sqrt{3}}{2}))$
6. $\cos(\arcsin(-\frac{1}{2}))$

□

Exercice 6. cos(arcsin(x)) *: cas général* :

1. Montrer que $\cos(\arcsin(x)) \geq 0$, $\forall x \in [-1;1]$;
2. Que vaut $\cos^2(\arcsin(x)) + \sin^2(\arcsin(x))$ pour $x \in [-1;1]$?
3. En déduire que $\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$ pour $x \in [-1;1]$.

□ T.11

1.1.2 Fonctions cosinus et arc cosinus

Définition 2 (Fonction arccos)**.** arccos (ou acos) est la fonction définie dans $[-1;1]$ et à valeurs dans $[0;\pi]$ qui à tout x associe l'angle θ dont le cosinus vaut x ($\cos(\theta) = x$). C'est la fonction réciproque de la fonction cos lorsque son domaine de définition est restreint à $[0;\pi]$. Son graphe est donné figure 2.

Remarque : Dire que $x = \cos(\theta)$ et $\theta = \arccos(x)$ est équivalent lorsque $x \in [-1;1]$ et $\theta \in [0;\pi]$ T.12

Angle θ	0	$\frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{\pi}{2}$ (90°)
$\cos(\theta)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Table 3 – Cosinus remarquables.

T.13




FIGURE 2 – Graphe du cos restreint et de arccos.

.

x	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\arccos(x)$	$\frac{\pi}{2}$ (90°)	$\frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\pi}{6}$ (30°)	0

TABLE 4 – Arcs cosinus remarquables.

EXERCICE 7. *Autour de* $\arccos(\cos(\theta))$:
Donner les valeurs des expressions suivantes :

1. $\arccos(\cos(\pi))$
2. $\arccos(\cos(\frac{3\pi}{2}))$
3. $\arccos(\cos(\frac{11\pi}{6}))$
4. $\arccos(\cos(-\frac{7\pi}{4}))$
5. $\arccos(\cos(7\pi+1))$
6. $\arccos(\cos(\frac{9\pi}{2}-1))$
7. $\arccos(\cos(\frac{7\pi}{4}+\frac{1}{2}))$
8. $\arccos(\cos(\frac{9\pi}{4}-\frac{1}{4}))$
9. $\arccos(\cos(\frac{1}{8}-\frac{5\pi}{4}))$

□

EXERCICE 8. $\arccos(cos(\theta))$ *: cas général* :

1. Soit $k \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in [2k\pi; \pi + 2k\pi]$. Que vaut $\arccos(\cos(\theta))$?
2. Soit $k \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in [(2k+1)\pi; \pi + (2k+1)\pi]$. Que vaut $\arccos(\cos(\theta))$?
3. Soit $k \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in [k\pi; \pi + k\pi]$. Que vaut $\arccos(\cos(\theta))$?

□

T.14

EXERCICE 9. *Autour de* $\sin(\arccos(x))$:
Donner les valeurs des expressions suivantes :

1. $\sin(\arccos(0))$
2. $\sin(\arccos(1))$
3. $\sin(\arccos(-1))$
4. $\sin(\arccos(-\frac{1}{2}))$
5. $\sin(\arccos(\frac{\sqrt{3}}{2}))$
6. $\sin(\arccos(-\frac{1}{2}))$

□

EXERCICE 10. $\sin(\arccos(x))$ *: cas général* :

1. Montrer que $\sin(\arccos(x)) \geq 0$, $\forall x \in [-1;1]$;
2. Que vaut $\cos^2(\arccos(x)) + \sin^2(\arccos(x))$ pour $x \in [-1;1]$?
3. En déduire que $\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2}$ pour $x \in [-1;1]$.

□

T.15

1.1.3 Fonctions tangente et arc tangente




FIGURE 3 – Graphe de tan, de tan restreint et de arctan.

.

Définition 3 (Fonction arctan)**.** arctan (ou atan) est la fonction définie dans $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $]-\pi/2;\pi/2[$ qui à tout x associe l'angle θ dont le tan vaut x ($\tan(\theta) = x$). C'est la fonction réciproque de la fonction tan lorsque son domaine de définition est restreint à $]-\pi/2;\pi/2[$. Son graphe est donné figure 3.

Remarque : Dire que $x = \tan(\theta)$ et $\theta = \arctan(x)$ est équivalent lorsque $\theta \in]-\pi/2;\pi/2[$. T.16

Angle θ	0	$\frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{\pi}{2}$ (90°)
$\tan(\theta)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞

TABLE 5 – Tangentes remarquables.

x	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$\arctan(x)$	0	$\frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{\pi}{2}$ (90°)

TABLE 6 – Arcs tangentes remarquables.

T.17

EXERCICE 11. *Autour de* $\arctan(\tan(\theta))$:
Donner les valeurs des expressions suivantes :

1. $\arctan(\tan(\pi))$
2. $\arctan(\tan(\frac{7\pi}{3}))$
3. $\arctan(\tan(\frac{11\pi}{6}))$
4. $\arctan(\tan(-\frac{7\pi}{4}))$
5. $\arctan(\tan(7\pi+1))$
6. $\arctan(\tan(\frac{9\pi}{2}-1))$
7. $\arctan(\tan(\frac{7\pi}{4}+\frac{1}{2}))$
8. $\arctan(\tan(\frac{9\pi}{4}-\frac{1}{4}))$
9. $\arctan(\tan(\frac{1}{8}-\frac{5\pi}{4}))$

□

EXERCICE 12. $\arctan(tan(\theta))$ *: cas général* :
Soit $k \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in [-\frac{\pi}{2}+k\pi;\frac{\pi}{2}+2\pi]$. Que vaut $\arctan(\tan(\theta))$? □

T.18

Exercice 13. *Autour de* $\sin(\arctan(x))$:
Donner les valeurs des expressions suivantes :

1. $\sin(\arctan(0))$
2. $\sin(\arctan(1))$
3. $\sin(\arctan(-1))$
4. $\sin(\arctan(-\sqrt{3}))$
5. $\sin(\arctan(\frac{\sqrt{3}}{3}))$
6. $\sin(\arctan(\sqrt{3}))$

□

Exercice 14. $\sin(\arctan(x))$ *: cas général* :

1. Montrer que $\sin(\arctan(x)) \geq 0$, pour $x \geq 0$ et $\sin(\arctan(x)) \leq 0$, pour $x \leq 0$;
2. On pose $\theta = \arctan(x)$ et $y = \sin(\theta)$. Montrer que $\tan^2(\theta) = \frac{y^2}{1-y^2}$;
3. En déduire que $x^2 = \frac{y^2}{1-y^2}$;
4. En déduire que $y^2 = \frac{x^2}{1+x^2}$;
5. En déduire que $\sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ pour $x \in \mathbb{R}$.

□

T.19

Exercice 15. *Autour de* $\cos(\arctan(x))$:
Donner les valeurs des expressions suivantes :

1. $\cos(\arctan(0))$
2. $\cos(\arctan(1))$
3. $\cos(\arctan(-1))$
4. $\cos(\arctan(\sqrt{3})$
5. $\cos(\arctan(\frac{\sqrt{3}}{3}))$
6. $\cos(\arctan(-\sqrt{3}))$

□

Exercice 16. $\cos(\arctan(x))$ *: cas général* :

1. Montrer que $\cos(\arctan(x)) \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$;
2. On pose $\theta = \arctan(x)$ et $y = \cos(\theta)$. Montrer que $\tan^2(\theta) = \frac{1-y^2}{y^2}$;
3. En déduire que $x^2 = \frac{1-y^2}{y^2}$;
4. En déduire que $y^2 = \frac{1}{1+x^2}$;
5. En déduire que $\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ pour $x \in \mathbb{R}$.

□

T.20

1.2 Formules de trigonométrie

1.2.1 Formules d'addition, de soustraction et de duplication

Théorème 4 (Addition et soustraction en trigonométrie). *Soient* $a,b \in \mathbb{R}$. *Alors :*

$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$	$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$	$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

Théorème 5 (Duplication en trigonométrie). *Soit* $a \in \mathbb{R}$. *Alors :*

$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$	$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$

T.21

Exercice 17. *Calcul de* $\cos(\frac{\pi}{12})$ *et* $\sin(\frac{\pi}{12})$:

1. Calculer $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$;
2. En déduire que $\cos(\frac{\pi}{12}) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$ et que $\sin(\frac{\pi}{12}) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

□

Exercice 18. *Calcul de* $\cos(\frac{\pi}{8})$:

1. Montrer que $\cos(\frac{\pi}{8}) > 0$;
2. Utiliser la formule de duplication $a = \frac{\pi}{8}$ et en déduire que $\cos(\frac{\pi}{8}) = \frac{\sqrt{\sqrt{2}+2}}{2}$.

□ T.22

Exercice 19. *Résolution de* $\cos(x) + \sin(x) = 1$:

1. Développer l'expression $(\cos(x) + \sin(x))^2$ en utilisant une identité remarquable ;
2. En déduire que $(\cos(x) + \sin(x))^2 = 1 + \sin(2x)$;
3. En déduire les solutions de l'équation $(\cos(x) + \sin(x))^2 = 1$;
4. En déduire les solutions de l'équation $\cos(x) + \sin(x) = 1$.

□ T.23

1.2.2 Formules de linéarisation et de factorisation

Théorème 6 (Linéarisation en trigonométrie). *Soient* $a,b \in \mathbb{R}$. *Alors :*

$\cos^2 a = \dfrac{1+\cos(2a)}{2}$	$\sin^2 a = \dfrac{1-\cos(2a)}{2}$
$\sin a \sin b = \dfrac{1}{2}\cos(a-b) - \dfrac{1}{2}\cos(a+b)$	$\cos a \cos b = \dfrac{1}{2}\cos(a+b) + \dfrac{1}{2}\cos(a-b)$
$\sin a \cos b = \dfrac{1}{2}\sin(a+b) + \dfrac{1}{2}\sin(a-b)$	

T.24

Exercice 20. *Période, fréquence, pulsation* :
Linéariser puis calculer la période, la fréquence et la pulsation des signaux suivants :

1. $s_1(t) = \sin(2t+1)\cos(3t-1)$
2. $s_2(t) = 2\sin(2t+1)\sin(4t-1)$
3. $s_3(t) = 3\cos(-2t+1)\cos(3t-1)$
4. $s_4(t) = 5\sin(5\pi t+2)\sin(3\pi t-1)$
5. $s_5(t) = \sin^2(\frac{2\pi}{3}t+1)$
6. $s_6(t) = 2\sin(\frac{\pi}{5}t+1)\cos(\frac{\pi}{6}t-1)$
7. $s_7(t) = \sin(\frac{2\pi}{3}t+1)\cos(3\pi t-1)$
8. $s_8(t) = 2\cos^2(\frac{\pi}{6}t-1)$

□ T.25

Théorème 7 (Factorisation en trigonométrie). *Soient* $a,b \in \mathbb{R}$. *Alors :*

$\sin a + \sin b = 2\sin\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\cos\left(\dfrac{a-b}{2}\right)$	$\sin a - \sin b = 2\sin\left(\dfrac{a-b}{2}\right)\cos\left(\dfrac{a+b}{2}\right)$
$\cos a + \cos b = 2\cos\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\cos\left(\dfrac{a-b}{2}\right)$	$\cos a - \cos b = -2\sin\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\sin\left(\dfrac{a-b}{2}\right)$

T.26

Exercice 21. *Quelques équations trigonométriques* :
Factoriser les signaux suivantes :

1. $s_1(t) = \sin(2t+1) + \sin(3t-1)$
2. $s_2(t) = \sin(2t+1) - \sin(4t-1)$
3. $s_3(t) = \cos(-2t+1) + \cos(3t-1)$
4. $s_4(t) = \cos(5\pi t+2) - \cos(3\pi t)$
5. $s_5(t) = \sin(\frac{2\pi}{3}t+1) + \cos(3\pi t)$
6. $s_6(t) = \sin(\frac{\pi}{5}t+1) - \cos(\frac{\pi}{6}t-1)$

□ T.27

1.2.3 Propriétés des fonctions trigonométriques réciproques

Théorème 8 (Fonctions trigonométriques réciproques). *Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors :*

- $\sin(\arcsin(x)) = x$ *si* $x \in [-1,1]$;
- $\cos(\arccos(x)) = x$ *si* $x \in [-1,1]$;
- $\tan(\arctan(x)) = x$;
- $\sin(\arccos x) = \cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$ *si* $x \in [-1,1]$;
- $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ *si* $x \in [-1,1]$;
- $\arctan(x) + \arctan(\frac{1}{x}) = \frac{\pi}{2}$ *si* $x \neq 0$;
- $\sin(\arctan x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$;
- $\cos(\arctan x) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

T.28

Exercice 22. *Fonctions trigonométriques réciproques* :
Donner les valeurs des expressions suivantes, lorsqu'elles existent :

1 $\arcsin(\cos(1))$	2 $\arccos(\sin(2))$	3 $\cos(\arcsin(1))$
4 $\sin(\arccos(2))$	5 $\arcsin(\sin(\frac{1}{2}))$	6 $\arccos(\cos(-1))$
7 $\cos(\arcsin(\frac{1}{4}))$	8 $\sin(\arctan(\frac{3}{2}))$	9 $\arcsin(\sin(3))$
10 $\arcsin(\sin(1))$	11 $\arcsin(\cos(2))$	12 $\sin(\arcsin(1))$
13 $\cos(\arcsin(2))$	14 $\arcsin(\cos(\frac{1}{2}))$	15 $\arcsin(\sin(-1))$
16 $\sin(\arcsin(\frac{1}{4}))$	17 $\cos(\arctan(\frac{3}{2}))$	18 $\arcsin(\cos(3))$

□

T.29

Exercice 23. *Fonctions trigonométriques réciproques* :
Donner les valeurs des expressions suivantes, lorsqu'elles existent :

1 $\arccos(\cos(1))$	2 $\arcsin(\sin(2))$	3 $\cos(\arccos(1))$
4 $\sin(\arcsin(2))$	5 $\arccos(\cos(\frac{1}{2}))$	6 $\arcsin(\cos(-1))$
7 $\sin(\arccos(\frac{1}{4}))$	8 $\cos(\arccos(\frac{3}{2}))$	9 $\arccos(\sin(4))$
10 $\arccos(\sin(1))$	11 $\arccos(\cos(2))$	12 $\sin(\arctan(1))$
13 $\cos(\arctan(2))$	14 $\arccos(\sin(\frac{1}{2}))$	15 $\arccos(\sin(-1))$
16 $\cos(\arccos(\frac{1}{4}))$	17 $\sin(\arccos(\frac{3}{2}))$	18 $\arccos(\cos(4))$

□

T.30

1.3 Forme polaire $A\cos(\omega t + \varphi)$

Théorème 9 ($A\cos(\omega t+\varphi) = a\cos(\omega t) - b\sin(\omega t)$). *Soient $A > 0$, $\omega > 0$ et $\varphi \in \mathbb{R}$. Alors $A\cos(\omega t+\varphi) = a\cos(\omega t) - b\sin(\omega t)$ avec $a = A\cos\varphi$ et $b = A\sin\varphi$.*

Exercice 24. $A\cos(\omega t + \varphi) = a\cos(\omega t) - b\sin(\omega t)$:
Écrire les signaux suivants sous la forme $s(t) = a\cos(\omega t) - b\sin(\omega t)$:

1. $s(t) = 2\cos(2t + \frac{\pi}{3})$;
2. $s(t) = 5\cos(3t + \frac{\pi}{4})$;
3. $s(t) = -3\sin(3t + \frac{\pi}{4})$.

□

T.31

Théorème 10 ($a\cos(\omega t) - b\sin(\omega t) = A\cos(\omega t + \varphi)$)**.** *Soient* $a,b \in \mathbb{R}$. *Alors* $a\cos(\omega t) - b\sin(\omega t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ *avec* $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ *et*

- *si* $a > 0$, $\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$ *(à* 2π *près) ;*
- *si* $a < 0$, $\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi$ *(à* 2π *près).*
- *si* $a = 0$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$ *si* $b > 0$ *et* $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ *si* $b < 0$

Exercice 25. $a\cos(\omega t) - b\sin(\omega t) = A\cos(\omega t + \varphi)$:
Soit $s(t) = \cos(t) - \sin(t)$.

- Montrer que $s(t) = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos(t) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\sin(t)\right)$;
- En déduire que $s(t) = \sqrt{2}\cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$;
- Montrer que l'on retrouve bien les valeurs données par les formules du théorème précédent.

□

T.32

Exercice 26. $a\cos(\omega t) - b\sin(\omega t) = A\cos(\omega t + \varphi)$:
Soit $s(t) = 2\cos(2t) - 3\sin(2t)$. On cherche à écrire $s(t)$ sous la forme $s(t) = A\cos(2t + \varphi)$.

1. Montrer que $A\cos(\varphi) = 2$ et $A\sin(\varphi) = 3$;
2. En déduire que $A^2 = 13$, et que $\tan(\varphi) = \frac{3}{2}$;
3. En déduire que $\cos(\varphi) = \frac{2}{\sqrt{13}}$ et $\sin(\varphi) = \frac{3}{\sqrt{13}}$;
4. En déduire que $\varphi \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$;
5. En déduire que $\varphi = \arctan(\frac{3}{2})$, à 2π près.

□

T.33

Exercice 27. $a\cos(\omega t) - b\sin(\omega t) = A\cos(\omega t + \varphi)$:
Soit $s(t) = -3\cos(2t) + 4\sin(2t)$. On cherche à écrire $s(t)$ sous la forme $s(t) = A\cos(2t + \varphi)$.

1. Montrer que $A\cos(\varphi) = -3$ et $A\sin(\varphi) = -4$;
2. En déduire que $A^2 = 25$, et que $\tan(\varphi) = \frac{4}{3}$;
3. En déduire que $\cos(\varphi) = -\frac{3}{5}$ et $\sin(\varphi) = -\frac{4}{5}$;
4. En déduire que $\varphi \in]-\pi; -\frac{\pi}{2}[$;
5. En déduire que $\varphi = \pi + \arctan(\frac{4}{3})$, à 2π près.

□

T.34

2 Fonctions puissances, logarithmes et exponentielles

2.1 Logarithmes

2.1.1 Logarithme népérien

Définition 11 (Logarithme népérien). Le **logarithme népérien** représente la valeur de la surface se trouvant entre le graphe de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ et l'axe des abscisses, entre les points d'abscisse 1 et $x \geq 1$. Si $0 < x < 1$, la surface correspondante est comptée négativement. On la note $x \mapsto \ln(x)$, ses domaines sont : $D_{\ln} = \mathbb{R}_+^*$, $I_{\ln} = \mathbb{R}$.

Valeurs particulières : $\ln(1) = 0$, $\ln(e) = 1$ (avec $e \approx 2{,}718$ le nombre d'Euler), $\ln(2) \approx 0{,}693$.




Figure 4 – Graphe du logarithme népérien.

T.36

Exercice 28. *Surface située sous la courbe $y = \frac{1}{x}$ et propriétés* :

1. Tracer le graphe de la fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ pour $0 < x \leq 4$. On fera figurer les positions des points de la courbe d'abscisses $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1, 2 et 4 ;
2. Hachurez la surface d'aire $\mathcal{A}_1 = \ln(2)$ située entre ce graphe et l'axe des abscisses ;
3. Hachurez la surface d'aire $\mathcal{A}_2$ située entre ce graphe et l'axe des abscisses, pour $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$;
4. Que peut-on dire de $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$? En déduire que $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2)$;
5. Que peut-on dire de $\ln\left(\frac{1}{x}\right)$ pour $x > 0$ avec un raisonnement analogue ?
6. Calculer $\ln(1)$;
7. Vers quoi tend $\ln(x)$ quand x tend vers $+\infty$?
8. Vers quoi tend $\ln(x)$ quand $x > 0$ tend vers 0 ?

□

T.37

Théorème 12 (Propriétés de calcul). *Soient $x, y \in \mathbb{R}_+^*$.*

- $\ln(x.y) = \ln(x) + \ln(y)$
- $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$
- $\ln(x^y) = y\ln(x)$

Attention
Soient $x,y \in \mathbb{R}_+^*$.

- $\ln(x+y) \neq \ln(x)+\ln(y)$
- $\dfrac{1}{\ln(x)} \neq -\ln(x)$

T.38

Exercice 29. *Propriétés de* $\ln(x)$:
Démontrer les égalités suivantes :

1. $\ln(18)-\ln(6)=\ln(3)$
2. $\ln(32)+\ln(16)=9\ln(2)$
3. $2\ln(7)-\ln(98)=-\ln(2)$
4. $\ln(56)-\ln(8)=\ln(7)$

□

Exercice 30. *Propriétés de* $\ln(x)$:
Sachant que $\ln(2)\approx 0{,}69$ et $\ln(3)\approx 1{,}10$ à 10^{-2} près, donner la valeur à 10^{-1} près des constantes suivantes (sans calculatrice!) :

1. $\ln(4)$
2. $\ln(6)$
3. $\ln(\frac{1}{2})$
4. $\ln(\frac{9}{4})$
5. $\ln(18)$

□

T.39

2.1.2 Logarithmes à base a

Définition 13 (Logarithme à base a)**.** Le logarithme à base a (avec $a>0$) est la fonction définie par : $x \mapsto \log_a(x)=\dfrac{\ln(x)}{\ln(a)}$.

Propriétés

- Mêmes domaines que ln : $D=\mathbb{R}_+^*$, $I=\mathbb{R}$
- Valeurs particulières : $\log_a(1)=0$, $\log_a(a)=1$, $\log_a(a^n)=n$
- Mêmes propriétés de calcul que ln
- Même allure graphique que ln avec une courbe « écrasée » d'un facteur $\dfrac{1}{\ln(a)}$ suivant l'axe des ordonnées

Exemple 14 ($\log_2(x)$ et $\log_{10}(x)$)**.** $\log_2(2^n)=n$ et $\log_{10}(10^n)=n$.

T.40

Définition 15 (Logarithme à base 10)**.** Le logarithme à base 10 est la fonction définie par : $x \mapsto \log_{10}(x)=\dfrac{\ln(x)}{\ln(10)}$.

Propriétés

- Mêmes domaines que ln : $D=\mathbb{R}_+^*$, $I=\mathbb{R}$
- Valeurs particulières : $\log_{10}(1)=0$, $\log_{10}(10)=1$, $\log_{10}(10^n)=n$
- Mêmes propriétés de calcul que ln
- Même allure graphique que ln avec une courbe « écrasée » d'un facteur $\dfrac{1}{\ln(10)}$ suivant l'axe des ordonnées

Remarque : $\log_{10}$ est utilisé pour définir l'**échelle logarithmique**, qui permet de représenter sur un même graphique des nombres dont les ordres de grandeurs sont très différents : il amplifie les variations proches de 0 et atténue les grandes variations.

T.41

2.1.3 Les décibels

Définition 16 (Décibels (dB))**.** Pour exprimer un rapport de puissance $G = P_1/P_2$ (gain G ou atténuation A), on a souvent recours à une échelle logarithmique, le décibel (dB) :

$$G_{\text{dB}} = 10\log_{10}(G) = 10\log_{10}\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

Propriétés

- Un doublement de puissance correspond à un gain d'environ 3 dB : $10\log_{10}(2G) \approx 3+10\log_{10}(G) = 3 + G_{\text{dB}}$;
- Une multiplication d'un facteur 10 correspond à un gain de 10 dB : $10\log_{10}(10G) = 10+10\log_{10}(G) = 10 + G_{\text{dB}}$;
- Une perte de puissance d'un facteur 2 correspond à une atténuation d'environ 3 dB : $10\log_{10}(G/2) \approx -3 + 10\log_{10}(G) = -3 + G_{\text{dB}}$;
- Une perte de puissance d'un facteur 10 correspond à une atténuation de 10 dB : $10\log_{10}(G/10) = -10 + 10\log_{10}(G) = -10 + G_{\text{dB}}$.

T.42

Exercice 31. *Décibels* : Compléter les tableaux suivants, sans calculatrice, en utilisant les propriétés des décibels.

gain		20				200	0,5
gain en dB	10 dB		-7 dB	-10 dB	0 dB		

gain		40				50	0,1
gain en dB	20 dB		13 dB	10 dB	3 dB		

□

T.43

Définition 17 (Le dBm et le dBW)**.** Pour P une puissance en Watts, on définit :

- $P_{\text{dBm}} = 10\log_{10}\left(\frac{P}{1\text{ mW}}\right)$;
- $P_{\text{dBW}} = 10\log_{10}\left(\frac{P}{1\text{ W}}\right) = P_{\text{dBm}} - 30dB.$

Remarques

- Ces unités sont sans dimension ;
- leurs propriétés sont dérivées de celles du décibel.

T.44

Exercice 32. *dBm et dBW* : Compléter les tableaux suivants, sans calculatrice, en utilisant les propriétés des décibels.

puissance		20 W			
puissance en dBm	10 dBm				0 dBm
puissance en dBW			-7 dBW	-10 dBW	

puissance		40 W			
puissance en dBm	20 dBm		13 dBm	10 dBm	
puissance en dBW					3 dBW

□

T.45

Rappel : loi d'Ohm
La puissance P dissipée par une résistance R traversée par un courant d'intensité I et de tension U vaut :
$P = UI = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$

Décibels en fonction de la tension
Pour $P_1 = \frac{U_1^2}{R}$ et $P_2 = \frac{U_2^2}{R}$ on obtient $\frac{P_1}{P_2} = \frac{U_1^2}{U_2^2}$ et $\left(\dfrac{P_1}{P_2}\right)_{\text{dB}} = 20\log_{10}\left(\dfrac{U_1}{U_2}\right)$

Définition 18 (Le dBV et le dBμV). Pour U une tension en Volts, on définit :

- $U_{\text{dBV}} = 20\log_{10}\left(\frac{U}{1\,\text{V}}\right)$;
- $U_{\text{dB}\mu\text{V}} = 20\log_{10}\left(\frac{U}{1\,\mu\text{V}}\right) = U_{\text{dBV}} + 120dB$.

T.46

Exercice 33. *dBμV et dBV* : Compléter les tableaux suivants, sans calculatrice, en utilisant les propriétés des décibels.

tension		20 V			
tension en dBμV	10 dBμV				0 dBμV
tension en dBV			-6 dBV	-10 dBV	
tension		40 V			
tension en dBμV	20 dBμV		14 dBμV	10 dBμV	
tension en dBV					6 dBV

□

T.47

2.2 Exponentielles

2.2.1 Fonction exponentielle

Définition 19 (Exponentielle). L'exponentielle est la fonction réciproque de ln définie par $x \mapsto \exp(x) = e^x$. Ses domaines sont : $D_{\exp} = \mathbb{R}$, $I_{\exp} = \mathbb{R}_+^*$. Son graphe est donné figure 5.

Valeurs particulières : $e^0 = 1$, $e^1 = e \approx 2{,}718$ avec e le nombre d'Euler.




Figure 5 – Graphe de la fonction exponentielle.

Remarque : Deux fonctions réciproques s'entendent comme deux fonctions qui inversent les relations entre antécédent et image : dans le cas de ln et exp, $x = \ln(y)$ est équivalent à $y = \exp(x)$ sous réserve que x et y soient choisis dans les ensembles de définition et les ensembles images des deux fonctions.

T.48

Théorème 20 (Propriétés de calcul). *Soient $x,y \in \mathbb{R}$.*

- $\exp(x+y) = \exp(x).\exp(y)$
- $\exp(x \cdot y) = (\exp(x))^y = (\exp(y))^x$
- $\exp(x-y) = \dfrac{\exp(x)}{\exp(y)}$

Attention

Soient $x,y \in \mathbb{R}$. $\exp(x)+\exp(y) \neq \exp(x+y)$

T.49

Exercice 34. *Propriétés de l'exponentielle* : Soit $t \in \mathbb{R}$. Simplifiez les expressions suivantes :

1 $s(t) = (\exp(t))^2 + 1 - e^{2t}$

2 $A = \sqrt{e}\exp(-\frac{1}{2})$

3 $B = (e^2 - e)\exp(-1)$

4 $s(t) = \left(e^t + e^{-t}\right)^2 - \exp(2t) - \exp(-2t)$

□

Exercice 35. *Résolution d'équations* : Résolvez les équations suivantes où t est l'inconnue réelle à déterminer :

1 $\exp(2t+1) = 2$

2 $7\exp(3t-1) + 2 = 0$

3 $\exp(2t) - 2\exp(t) + 1 = 0$

4 $\exp(t) - 2\exp(-t) + 1 = 0$

□

T.50

Définition 21 (Exponentielle à base a). Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. L'exponentielle à base $a \neq 1$ est la fonction définie par $x \mapsto a^x = e^{x\ln(a)}$. Des exemples de graphes pour différentes valeurs de a sont donnés figure 6.

Propriétés

- Mêmes domaines que l'exponentielle
- Propriétés de calculs mathématiques déduites de celles de exp et de ln (cf. théorème 12 et 20)

Cas particuliers

- Lorsque $a = 1$, on retrouve la fonction constante $x \mapsto 1$;
- pour $a = 2$, on obtient $x \mapsto 2^x$;
- pour $a = 10$, on obtient $x \mapsto 10^x$.




Figure 6 – Graphe de quelques expontielles à base a.

T.51

Exercice 36. *Propriétés de l'exponentielle de base a :* Soit $t \in \mathbb{R}$. Simplifiez les expressions suivantes :

1 $s(t) = 2^t \exp(2t\ln(2)) - 8^t$

2 $A = \sqrt{2}\exp(-\frac{1}{2}\ln(2))$

3 $B = 10^{\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{3}{2}\ln(10)\right)$

4 $s(t) = \left(2^t - 2^{-t}\right)^2 - \exp(2t\ln(2)) - \frac{1}{2^{2t}}$

□

Exercice 37. *Résolution d'équations :* Résolvez les équations suivantes où t est l'inconnue réelle à déterminer :

1 $10^{2t-1} = 2$

2 $7 \cdot 2^{5t-1} + 1 = 0$

3 $10^{2t} + 2 \cdot 10^t + 3 = 0$

4 $2^t - 2^{-t} + 1 = 0$

□

T.52

2.3 Monômes de puissances réelles

Définition 22 (Monômes de puissances réelles)**.** Les monômes de puissances réelles généralisent les monômes x^n (où $n \in \mathbb{N}$) à des n dans $\mathbb{R}$. Ils sont définis par : $x \mapsto x^\alpha = \exp\left(\alpha \ln(x)\right) = e^{\alpha \ln(x)}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$, sur les domaines : $D = \mathbb{R}_+^*$, $I = \mathbb{R}_+^*$. Des exemples de graphes pour différentes valeurs de α sont donnés figure 7.

Propriétés

Propriétés de calculs mathématiques déduites de celles de exp et de ln (cf. théorème 12, et 20)

Cas particuliers

- Lorsque $\alpha = 0$, la fonction est constante $x \mapsto 1$
- Lorsque $\alpha = 1$, la fonction est l'identité $x \mapsto x$




Figure 7 – Graphe de quelques puissances réelles.

T.53

2.4 Racines n-ièmes

Définition 23 (Racines n-ièmes)**.** Les **racines n-ièmes** sont les fonctions définies par $f(x) = \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.

$f(x)$ est le réel y tel que $y^n = x$; dans $\mathbb{R}$, ce nombre est unique et peut être négatif lorsque n est impair ! Si n est pair, on impose en plus que $x \geq 0$ pour obtenir une définition unique.

Leurs graphes sont donnés figure 8. Leurs domaines sont :

si n est :	pair	impair
D_f	$\mathbb{R}^+$	$\mathbb{R}$
I_f	$\mathbb{R}^+$	$\mathbb{R}$




FIGURE 8 – Graphe des fonctions racines n-ièmes.

T.54

Théorème 24 (Manipulation des **exposants** et des **opérandes**). *Soient $x \in \mathbb{R}^+$ et $y \in \mathbb{R}_+^*$.*

- $\sqrt[n\cdot m]{x} = \sqrt[n]{\left(\sqrt[m]{x}\right)} = x^{\frac{1}{n\cdot m}} = \left(x^{\frac{1}{m}}\right)^{\frac{1}{n}}$
- $\sqrt[\frac{n}{m}]{x} = \sqrt[n]{(x^m)} = x^{\frac{m}{n}} = (x^m)^{\frac{1}{n}}$
- $\sqrt[n]{(x\cdot y)} = \sqrt[n]{x}\cdot\sqrt[n]{y} = (x\cdot y)^{\frac{1}{n}} = x^{\frac{1}{n}}\cdot y^{\frac{1}{n}}$
- $\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{n}} = \frac{x^{\frac{1}{n}}}{y^{\frac{1}{n}}}$
- $(\sqrt[n]{x})^m = \sqrt[n]{x^m} = \left(x^{\frac{1}{n}}\right)^m = (x^m)^{\frac{1}{n}} = x^{\frac{m}{n}}$

T.55

Attention à ne pas inventer des propriétés !
Soient $x,y \in \mathbb{R}^+$, alors :

- $\sqrt[n+m]{x} \neq \sqrt[n]{x} + \sqrt[m]{x}$ $\qquad x^{\frac{1}{n+m}} \neq x^{\frac{1}{n}} + x^{\frac{1}{m}}$
- $\sqrt[n]{(x+y)} \neq \sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{y}$ $\qquad (x+y)^{\frac{1}{n}} \neq x^{\frac{1}{n}} + y^{\frac{1}{n}}$

T.56

EXERCICE 38. *Racines et puissances fractionnaires* :
Démontrer les égalités suivantes :

1 $\sqrt{27} + \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$ 2 $\sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{2} = 4\sqrt[3]{2}$ 3 $2\sqrt[9]{2^6} + 2^{\frac{5}{3}} = 4\sqrt[3]{4}$

□

T.57

3 Les nombres complexes

3.1 Un peu d'histoire

- école italienne (Cardan, Bombelli), autour de 1570 ;
- introduits pour résoudre les équations du troisième degré $x^3 + px + q = 0$

$$x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

Exemple 25 (Équation $x^3 - x = 0$ (avec $p = -1$ et $q = 0$)). Solution évidente : 0, pourtant la formule précédente ne marche pas : $\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} = -1/27 < 0$, mais si on admet l'existence de $\sqrt{-1}$, on retrouve bien $x = 0$:

$$x = \sqrt[3]{\sqrt{\frac{-1}{27}}} + \sqrt[3]{-\sqrt{\frac{-1}{27}}}$$

T.59

3.2 Algèbre des nombres complexes

3.2.1 Définition de l'ensemble des complexes $\mathbb{C}$

Définition 26 (Ensemble des complexes $\mathbb{C}$)**.** On appelle nombre complexe, ou simplement complexe, tout nombre z qui s'écrit sous la forme $z = x + jy$ avec $(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ et où j est un nombre (dit imaginaire) vérifiant la relation $j^2 = -1$. L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$, il est muni de deux **lois de composition internes** (notées + et ×) définies, pour tout $z_1 = x_1 + jy_1 \in \mathbb{C}$ et $z_2 = x_2 + jy_2 \in \mathbb{C}$, par :

- loi d'**addition** sur $\mathbb{C}$: $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$;
- loi de **multiplication** sur $\mathbb{C}$: $z_1 \times z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + j(x_1y_2 + y_1x_2)$. En particulier, on retrouve $j^2 = j \times j = -1$.

T.60

Définition 27 (Partie réelle, imaginaire et notation cartésienne)**.**

- x est appelé **partie réelle** et on note $x = \mathrm{Re}\{z\}$;
- y est appelé **partie imaginaire** et on note $y = \mathrm{Im}\{z\}$;
- la notation $x + jy$ est appelée la **notation cartésienne** du nombre complexe z.

T.61

Exercice 39. *Calcul sur les complexes* :
Calculer les nombres complexes suivants :

1 $z = (1 + j) + (3 - j)$ 2 $z = (-3 + j) - (4 - 3j)$ 3 $z = (2 - j) + (-3 - 9j)$
4 $z = (-2 - 3j)(1 - j)$ 5 $z = (1 + j)(-1 - j)$ 6 $z = (5 + 3j)(5 - 3j)$

□

Remarques

- les réels sont des cas particuliers des complexes, puisque ce sont les nombres de la forme $x + 0 \times j$. De fait $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$;
- les nombres complexes de la forme jy avec y quelconque sont appelés des **imaginaires purs** ;
- on note aussi souvent i plutôt que j. Mais pour éviter la confusion avec la lettre désignant l'intensité en électricité, nous préférerons utiliser j.

T.62

3.2.2 $\mathbb{C}$, un corps commutatif

Propriété 28 (Addition dans $\mathbb{C}$). *Soient $z = x + jy, z_1, z_2$ et z_3 quatre complexes. L'addition :*

1. *est **commutative** : $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$;*
2. *est **associative** : $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$;*
3. *possède un (unique) **élément neutre** 0 ;*
4. *définit l'(unique) **opposé** de $z = x + jy$ comme étant le complexe $-z = -x - jy$.*

Remarques : soient z_1 et z_2 deux complexes, alors

- on dit que z_1 est un élément neutre de l'addition si pour tout complexe z, on a $z_1 + z = z$;
- on dit que z_2 est un opposé du complexe z lorsque $z_2 + z = z_1$ où z_1 est l'élément neutre de la loi d'addition (c'est-à-dire $z_1 = 0$).

T.63

Propriété 29 (Multiplication dans $\mathbb{C}$). *Soient $z = x + jy, z_1, z_2$ et z_3 quatre complexes. La multiplication :*

1. *est **commutative** : $z_1 \times z_2 = z_2 \times z_1$;*
2. *est **associative** : $(z_1 \times z_2) \times z_3 = z_1 \times (z_2 \times z_3)$;*
3. *possède un (unique) **élément neutre** qui est égal à 1 ;*
4. *définit l'**inverse** de $z = x + jy \neq 0$ comme étant le complexe $\dfrac{x}{x^2+y^2} - j\dfrac{y}{x^2+y^2}$;*
5. *est **distributive sur l'addition** : $z_1 \times (z_2 + z_3) = (z_1 \times z_2) + (z_1 \times z_3)$.*

Remarques :

- toutes ces propriétés font de $\mathbb{C}$ un **corps commutatif** ;
- on dit que z_1 est l'inverse du complexe z lorsque $z_1 \times z = 1$ où 1 est l'élément neutre de la loi de multiplication.

T.64

Exercice 40. *Inverse* :
Calculer l'inverse des nombres complexes suivants :
1 $z = 4 - j$ 2 $z = -3 + j$ 3 $z = -3 - 9j$ 4 $z = 3 + 4j$ □

Exercice 41. *Division* :
Calculer les nombres complexes suivants :
1 $z = \frac{1+j}{-1-j}$ 2 $z = \frac{2+3j}{-2-3j}$ 3 $z = \frac{2+3j}{1+j}$ 4 $z = \frac{-2-3j}{1-j}$ □

T.65

3.2.3 $\mathbb{C}$, un EV sur $\mathbb{R}$ de dimension 2

Propriété 30 (Structure d'EV de $\mathbb{C}$). *Soient $z = x + jy \in \mathbb{C}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On définit la **multiplication externe** « $\cdot$ » d'un complexe par un réel par : $\lambda \cdot z = (\lambda x) + j(\lambda y)$. Alors, $\mathbb{C}$ muni de la loi d'addition précédemment définie et de cette loi de multiplication externe est un EV de dimension 2 et de base canonique $(1, j)$.*

Notation complexe et vecteur
Ainsi, un nombre complexe apparaît comme un vecteur à 2 dimensions : $z = x + jy$ peut-être vu comme le vecteur $\vec{u} = (x, y) = x\vec{i} + y\vec{j}$.

T.66

Remarques :

- on utilise souvent la même notation pour la multiplication interne « $\times$ » et la multiplication externe « $\cdot$ », voire pas de symbole du tout. Le contexte permet de savoir de quelle multiplication il s'agit ;
- un nombre réel pouvant être vu comme un nombre complexe particulier, la multiplication externe peut aussi être vue comme une multiplication interne particulière.

Propriété 31 (Égalité de deux complexes). *Soient $z_1 = x_1 + jy_1$ et $z_2 = x_2 + jy_2$ deux complexes. Alors :*

- $z_1 = z_2 \Leftrightarrow [x_1 = x_2 \text{ et } y_1 = y_2]$

- $z_1 = 0 \Leftrightarrow [x_1 = 0 \ \underline{et}\ y_1 = 0]$

T.67

Soit $z = x + jy$ un complexe. Puisque $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ (cf. figure 9) :

- **Interprétation affine** : on peut définir le point $M(z)$ du plan avec z l'**affixe** du point M comme le point de **coordonnées cartésiennes** (x,y) ;
- **Interprétation vectorielle** : on peut définir le vecteur $\vec{u}(z)$ du plan avec z l'**affixe** du vecteur comme le vecteur reliant l'origine O au point de coordonnées (x,y).




FIGURE 9 – Coordonnées cartésiennes (x,y) d'un point M du plan.

T.68

3.2.4 Conjugué d'un nombre complexe

Définition 32 (Conjugué)**.** Le **conjugué** du complexe $z = x + jy$ est le nombre complexe noté $\overline{z}$ ou z^* défini par $\overline{z} = z^* = x - jy$. L'opération effectuée s'appelle la conjugaison.

Propriété 33 (Conjugaison)**.** *Soient $z = x + jy$, $z_1 = x_1 + jy_1$ et $z_2 = x_2 + jy_2$ trois nombres complexes. Alors :*

1. $x = \mathrm{Re}\{z\} = \mathrm{Re}\{z^*\} = \dfrac{z + z^*}{2}$ *et* $y = \mathrm{Im}\{z\} = -\mathrm{Im}\{z^*\} = \dfrac{z - z^*}{2j}$
2. $(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*$
3. $(z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^*$
4. $\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^* = \dfrac{z_1^*}{z_2^*}$

T.69

Exercice 42. *Conjugaison* : Calculer les conjugués des nombres complexes suivants :
1 $z = 4 - j$ 2 $z = -3 + j$ 3 $z = -3 - 9j$ 4 $z = 3 + 4j$ □

Exercice 43. *Conjugaison et opérations* : Calculer les conjugués des nombres complexes suivants :
1 $z = (1 + j) + (3 + j)$ 2 $z = (3 + j) - (4 - 3j)$ 3 $z = (2 + j) + (-3 - 9j)$
4 $z = (-2 - 3j)(1 - 2j)$ 5 $z = (2 + j)(-2 - j)$ 6 $z = (2 + 3j)(5 - 2j)$ □

T.70

3.3 Forme polaire d'un nombre complexe

3.3.1 Coordonnées polaires

Soit $z = x + jy$ un complexe. Le point $M(z)$ du plan ou le vecteur $\overrightarrow{OM}(z) = \vec{u}(z)$ du plan peuvent être repérés par leurs coordonnées polaires (cf. figure 10) :

- distance à l'origine : $r = \|\overrightarrow{OM}\| = \|\vec{u}\|$; r **est appelé le module de z et noté $r = |z|$.**
- angle polaire : $\theta = (\widehat{\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM}}) = (\widehat{\overrightarrow{Ox}, \vec{u}})$; θ **est appelé l'argument de z et noté $\theta = \arg(z)$.**

Conclusion : Le couple module/angle (r,θ) de z peut aussi servir à repérer M (ou $\vec{u}$) dans le plan au même titre que les coordonnées cartésiennes. Il forme les **coordonnées polaires** de $M(z)$.

T.71




FIGURE 10 – Coordonnées cartésiennes (x,y) et polaires (r,θ) d'un point M du plan.

Définition 34 (Module et argument d'un nombre complexe)**.** Soit $z = x + jy$ un complexe. Alors il existe un unique $r = |z| > 0$ appelé module de z et un unique $\theta = \arg(z) \in]-\pi, \pi]$ appelé argument de z tels que $z = r\cos\theta + jr\sin\theta$ et

- $r = |z| = \sqrt{x^2+y^2}$;
- $x = r\cos(\theta)$;
- $y = r\sin(\theta)$.

Remarque : lorsque z est un réel, le module est la valeur absolue, définie pour tout x dans $\mathbb{R}$, par

T.72 $$|x| = \begin{cases} x & \text{, si } x \geq 0 \\ -x & \text{, si } x < 0 \end{cases}$$

Arguments remarquables

- si $z \in \mathbb{R}_+^*$, alors $\arg\{z\} = 0$;
- si $z \in \mathbb{R}_-^*$, alors $\arg\{z\} = \pi$;
- si $z = jy$ avec $y \in \mathbb{R}_+^*$, alors $\arg\{z\} = \frac{\pi}{2}$;
- si $z = jy$ avec $y \in \mathbb{R}_-^*$, alors $\arg\{z\} = -\frac{\pi}{2}$.

T.73

EXERCICE 44. *Calculer le module des nombres complexes suivants :*

1 $z = 1 + j$ 2 $z = 1 - j$ 3 $z = 2 + 3j$ 4 $z = -2 - 3j$

□

EXERCICE 45. *Donner la forme cartésienne des complexes dont le module et l'argument sont :*

1 $(1; \frac{\pi}{4})$ 2 $(\sqrt{3}; -\frac{\pi}{3})$ 3 $(7; 0)$ 4 $(5; \pi)$ 5 $(3; \frac{\pi}{2})$

□

T.74

Propriété 35 (Module)**.** *Soient $z = x + jy$, $z_1 = x_1 + jy_1$ et $z_2 = x_2 + jy_2$ trois nombres complexes et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :*

1. $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$ *et* $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$;
2. *Inégalité triangulaire :* $\big||z_1| - |z_2|\big| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$;
3. $zz^* = |z|^2$;
4. $\frac{1}{z} = \frac{z^*}{|z|^2}$;
5. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 z_2^*}{|z_2|^2}$;
6. $|z^n| = |z|^n$.

T.75

EXERCICE 46. *Calculer le module des nombres complexes suivants :*

1 $z = \frac{1+j}{-1-j}$ 2 $z = \frac{2+3j}{-2-3j}$ 3 $z = \frac{2+3j}{1+j}$
4 $z = (1+j)(-1-j)$ 5 $z = (5+3j)(5-3j)$ 6 $z = (2+3j)(1+j)$
7 $z = (1+j)^2$ 8 $z = (2+3j)^{-4}$ 9 $z = \frac{1}{-2-3j}$

□

Exercice 47. *Calculer le module des nombres complexes suivants :*
1 $z = \frac{1}{3+j}$ 2 $z = \frac{1}{-3+j}$ 3 $z = \frac{1}{-2-2j}$ 4 $z = \frac{1}{1+4j}$

□

Exercice 48. *Calculer le module des nombres complexes suivants :*
1 $z = \frac{1+j}{-2-j}$ 2 $z = \frac{2+3j}{-2-2j}$ 3 $z = \frac{2+3j}{2+j}$ 4 $z = \frac{-2-j}{1-j}$

□

T.76

Propriété 36 (Argument). *Soient $z = x + jy$, $z_1 = x_1 + jy_1$ et $z_2 = x_2 + jy_2$ trois nombres complexes et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :*

1. $\arg\{z_1 z_2\} \equiv \arg\{z_1\} + \arg\{z_2\} \pmod{2\pi}$;
2. $\arg\{z_1/z_2\} \equiv \arg\{z\} - \arg\{z_2\} \pmod{2\pi}$;
3. $\arg\{1/z\} \equiv -\arg\{z\} \pmod{2\pi}$;
4. $\arg\{z^*\} \equiv -\arg\{z\} \pmod{2\pi}$;
5. $\arg\{z^n\} \equiv n\arg\{z\} \pmod{2\pi}$;

T.77

Exercice 49. *Propriétés de l'argument :* Soient $z_1 = \sqrt{2} + j\sqrt{2}$ et $z_2 = \sqrt{3} + j$. Sachant que $\cos\frac{\pi}{4} + j\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}$ et que $\cos\frac{\pi}{6} + j\sin\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}j$, donner le module et l'argument des complexes suivants :
1 z_1 2 z_2 3 z_1^* 4 z_2^* 5 $1/z_1$ 6 $z_1 z_2$
7 z_2^2 8 z_1^*/z_2 9 z_1^4 10 z_2^3 11 z_1^{-4} 12 jz_1

□

T.78

Soient :

- z_1 de module r et d'angle θ
- z_2 de module r et d'angle $\theta + 2\pi$ (360°)

z_1 et z_2 définissent exactement le même point M du plan 2D (cf. figure 11). Donc $z_1 = z_2$.

Propriété 37 (Égalité de deux complexes). *Soient z_1 et z_2 deux complexes de module respectif r_1 et r_2 et d'angle avec $(0,x)$ respectif θ_1 et θ_2. Alors : $z_1 = z_2 \Leftrightarrow [r_1 = r_2$ et $\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{2\pi}]$. Dire que $\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{2\pi}$ signifie qu'il existe une valeur $k \in \mathbb{Z}$ telle que $\theta_1 = \theta_2 + 2k\pi$.*




Figure 11 – De l'unicité de l'argument.

Pour définir un complexe z (et donc un point M) de **manière unique** à l'aide d'un couple module/angle (r,θ), il faut donc lever toutes ambiguïtés sur l'angle : c'est l'objectif de l'**argument** de z qui fournit une valeur d'angle limitée à $]-\pi;\pi]$.

T.79

Définition 38 (Argument d'un complexe non nul). Soit $z = x + jy$ un complexe non nul. Alors : $\exists! \theta \in]-\pi,\pi]$ tel que $z = |z|(\cos\theta + j\sin\theta)$. Ce nombre (réel), noté $\arg\{z\}$, est appelé **argument** de z. Il est tel que $\tan(\theta) = \dfrac{y}{x}$ avec :

- si $x > 0$, $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$ et $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$
- si $x < 0$ et $y \geq 0$, $\theta \in \left]\frac{\pi}{2},\pi\right]$ et $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi$
- si $x < 0$ et $y < 0$, $\theta \in \left]-\pi,-\frac{\pi}{2}\right[$ et $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi$
- si $x = 0$, $\theta = \frac{\pi}{2}$ si $y > 0$ et $\theta = -\frac{\pi}{2}$ si $y < 0$

Remarque : $\arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi$ et $\arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi$ désignent le même angle, à 2π près. Par commodité, on
T.80 pourra alors simplement utiliser $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi$ lorsque $x < 0$ sans se préoccuper du signe de y.

3.3.2 Notation exponentielle d'un nombre complexe

Définition 39 (Notation exponentielle d'un complexe). Soit $z = x + jy$ un complexe de module r et d'(unique) argument θ. Alors z se note sous la **forme exponentielle** $z = re^{j\theta}$. Toutes les propriétés des exponentielles réelles restent vraies dans $\mathbb{C}$ et sont analogues aux propriétés des puissances.

Remarque : Pour faciliter les calculs, on utilise souvent la notation $re^{j\theta}$ même lorsque $\theta \notin]-\pi;\pi]$.




FIGURE 12 – Coordonnées cartésiennes (x,y) et polaires (r,θ) d'un point M du plan.

T.81

Propriété 40 (Identification du module et de l'argument). *Si $r \in \mathbb{R}_+^*$ et $\theta \in]-\pi,\pi]$, et $z = re^{j\theta}$, alors*

- $|z| = r$;
- $\arg\{z\} = \theta$.

Propriété 41 (Quelques complexes remarquables).

- *$e^{j\theta}$ est le nombre complexe de module 1 et d'argument θ* $(\mathrm{mod}\ 2\pi)$;
- $e^{j0} = 1$, $e^{j\frac{\pi}{2}} = j$, $e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j$, $e^{j\pi} = -1$, $e^{j2\pi} = 1$;
- $re^{j0} = r$, $re^{j\frac{\pi}{2}} = jr$, $re^{-j\frac{\pi}{2}} = -jr$, $re^{j\pi} = -r$, $re^{j2\pi} = r$.

T.82

Exercice 50. *Forme polaire* : Soit $z = 2 - j$.

1. Représenter z graphiquement ;
2. Donner la forme polaire de z.

Mêmes questions pour $z = -5 + 3j$.

Correction : $z = \sqrt{5}\exp(j\arctan(-1/2))$ puis $z = \sqrt{34}\exp(j(\arctan(-3/5) + \pi))$ □

T.83

Exercice 51. *Module et argument* : Déterminer le module et l'argument (en degrés et en radians) des nombres complexes suivants, et représentez-les graphiquement :

1 $z_1 = -1 - j$ 2 $z_2 = 3 - j$ 3 $z_3 = -2 + 4j$ 4 $z_4 = \sqrt{3} + j$
5 $z_5 = -2 + j\sqrt{12}$ 6 $z_6 = -4 + 4j$ 7 $z_7 = 3 - 3j$ 8 $z_8 = \dfrac{z_1}{z_2}$
9 $z_9 = \dfrac{z_1}{z_3}$ 10 $z_{10} = \dfrac{z_2}{z_4}$

Éléments de réponse : $|z_1| = \sqrt{2}$, $\arg(z_1) = -135° = -\frac{3\pi}{4}$; $|z_2| = \sqrt{10}$, $\arg(z_2) = -\frac{180}{\pi}\arctan(\frac{1}{3})° = -\arctan(\frac{1}{3})$; $|z_3| = 2\sqrt{5}$, $\arg(z_3) = 180 - \frac{180}{\pi}\arctan(2)° = \pi - \arctan(2)$

Correction :

4. $|z_4| = 2$, $\arg(z_4) = 30° = \frac{\pi}{6}$
5. $|z_5| = 4$, $\arg(z_5) = 120° = \frac{2\pi}{3}$
6. $|z_6| = 4\sqrt{2}$, $\arg(z_6) = 135° = \frac{3\pi}{4}$
7. $|z_7| = 3\sqrt{2}$, $\arg(z_7) = -45° = -\frac{\pi}{4}$

□

T.84

Exercice 52. *Notation exponentielle* : Déterminer la notation exponentielle des nombres complexes suivants :

1 $z_8 = (-j)^{18}$ 2 $z_9 = (1+j)^{-23}$ 3 $z_{10} = (-\sqrt{3} + j)^{51}$
4 $z_{11} = \dfrac{1 + j\sqrt{3}}{\sqrt{3} + j}$ 5 $z_{12} = 1 + \cos\varphi + j\sin\varphi$ 6 $z_{13} = (1 + j\tan\varphi)^2$

Correction :

1. $z_8 = \exp(-j\pi/2)^{18} = \exp(j\pi)$
2. $z_9 = (\sqrt{2}\exp(j\pi/4))^{-23} = (\sqrt{2})^{-23}\exp(j\pi/4)$
3. $z_{10} = (2\exp(j5\pi/6))^{51} = 2^{51}\exp(j\pi/2)$
4. $z_{11} = \dfrac{2\exp(j\pi/3)}{2\exp(j\pi/6)} = \exp(j\pi/6)$
5. $z_{12} = 2\cos(\varphi/2)\exp(j\varphi/2)$ avec le th. de l'angle inscrit
6. $z_{13} = \dfrac{1}{\cos^2\varphi}\exp(j2\varphi)$

□

T.85

Exercice 53. *Module et argument* : Déterminer le module et l'argument du complexe z tel que $z = (1+j)^n + (1-j)^n$, avec $n \in \mathbb{Z}$.

Correction : On a $1 + j = \sqrt{2}\exp(j\frac{\pi}{4})$ et $1 - j = \sqrt{2}\exp(-j\frac{\pi}{4})$ donc en développant l'écriture complexe pour identifier partie réelle et imaginaire, on déduit : $z = 2\sqrt{2}^n\cos(n\pi/4)$ à détailler en fonction de n □

Exercice 54. *Module et argument* : Soit $z = e^{j\theta}$. Déterminer le module et l'argument du complexe Z défini par : $Z = z^2 + z$.

Correction : Médotho identique à l'exo précédent, donnant $Z = 2\cos(\theta/2)\exp(j3\theta/2)$. □

T.86

3.4 Application à la géométrie : transformations du plan et lieu géométrique

3.4.1 Transformations du plan

Théorème 42 (Translation). *Soit z_1 (respectivement z_2) l'affixe du vecteur $\vec{u_1}$ (respectivement $\vec{u_2}$) et du point M_1 (respectivement M_2) du plan. Alors (cf. figure 13) :*

- *Le vecteur $\vec{u} = \vec{u_1} + \vec{u_2}$ est d'affixe $z = z_1 + z_2$;*

- *Le point M tel que* $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{OM_2}$ *est d'affixe* $z = z_1 + z_2$;
- *Plus généralement le point* $A(a)$*, translaté du point* $B(b)$ *par la translation de vecteur* $\vec{u}(u)$*, est d'affixe* $a = b + u$;




FIGURE 13 – Translation dans le plan.

T.87

Théorème 43 (Symétries)**.** *Soit z un complexe, affixe du point M. Alors (cf. figure 14) :*

- *Le point M'(z'), symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses (O,x), est d'affixe* $z' = z^*$;
- *Le point M''(z''), symétrique de M par rapport à l'origine, est d'affixe* $z'' = -z$.




FIGURE 14 – Symétries dans le plan.

T.88

Théorème 44 (Rotations). *Soit B le point du plan d'affixe $b = x_b + jy_b = r_b \exp(j\theta_b)$.*

- *La rotation de centre 0 et d'angle θ transforme le point B en le point B' d'affixe $b' = x_{b'} + jy_{b'} = r_b \exp(j(\theta_b + \theta))$ avec $b' = b\exp(j\theta)$, $x_{b'} = x_b\cos(\theta) - y_b\sin(\theta)$ et $y_{b'} = x_b\sin(\theta) + y_b\cos(\theta)$. Cette transformation est illustrée figure 15.*
- *La rotation de centre $A(a)$ et d'angle θ transforme le vecteur $\overrightarrow{AB}(b-a)$ en le vecteur $\overrightarrow{AB'}(b'-a)$ avec $b' - a = (b-a).\exp(j\theta))$, autrement dit $b' = a + (b-a)\exp(j\theta)$, $x_{b'} = x_a + (x_b - x_a)\cos(\theta) - (y_b - y_a)\sin(\theta)$ et $y_{b'} = y_a + (x_b - x_a)\sin(\theta) + (y_b - y_a)\cos(\theta)$*




FIGURE 15 – Rotation de centre O et d'angle θ

T.89

3.4.2 Produit scalaire

Définition 45 (Produit scalaire). Soient $\vec{u_1}$ et $\vec{u_2}$ deux vecteurs du plan, d'affixes respectives $z_1 = x_1 + jy_1$ et $z_2 = x_2 + jy_2$. Alors le **produit scalaire de $\vec{u_1}$ et $\vec{u_2}$**, noté $\langle \vec{u_1}, \vec{u_2} \rangle$, est le nombre réel défini par :

- Définition géométrique : $\langle \vec{u_1}, \vec{u_2} \rangle = \|\vec{u_1}\|\|\vec{u_2}\| \cos\left(\widehat{(\vec{u_1}, \vec{u_2})}\right)$.
- Définition analytique : $\langle \vec{u_1}, \vec{u_2} \rangle = x_1x_2 + y_1y_2$;
- Définition avec les nombres complexes : $\langle \vec{u_1}, \vec{u_2} \rangle = \text{Re}\{z_1^* z_2\}$.

Rappels :

- Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dits **colinéaires** s'il existe un réel λ non nul tel que $\vec{u} = \lambda\vec{v}$;
- Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dits **orthogonaux** si $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$.

T.90

3.4.3 Lieu géométrique

Définition 46 (Lieu géométrique)**.** Le **lieu géométrique** est l'ensemble des points (ou de manière équivalente leurs affixes complexes) satisfaisant une condition donnée.

Exemple 47 (Des lieux géométriques : droites, cercles, disques, ...). Soient a, b et u trois nombres complexes. Alors :

1. La droite passant par le point $A(a)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(u)$ est d'**équation paramétrique** $\mathcal{D} = \{z \in \mathbb{C} / z = a + \lambda u, \lambda \in \mathbb{R}\}$;
2. La droite passant par le point $A(a)$ et de vecteur normal $\vec{u}(u)$ est d'équation $\mathcal{D} = \{z \in \mathbb{C} / \text{Re}\{(z-a)^* u\} = 0\}$;
3. La droite passant par les points $A(a)$ et $B(b)$ est d'**équation paramétrique** $\mathcal{D} = \{z \in \mathbb{C} / z = a + \lambda(b-a), \lambda \in \mathbb{R}\}$;
4. Le cercle de centre $A(a)$ et de rayon R est : $\mathcal{C} = \{z \in \mathbb{C} / |z-a| = R\}$;
5. Le disque ouvert de centre $A(a)$ et de rayon R est : $\mathcal{D} = \{z \in \mathbb{C} / |z-a| < R\}$.

T.91

Exercice 55. *Équation de droite* : Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}$:

1. passant par le point $M(1,2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(1,-1)$.
2. passant par le point $M(1,2)$ et de vecteur normal $\vec{u}(1,-1)$.
3. passant par les points $M(1,2)$ et $N(-1,1)$.

Correction :

1. Soit $M'(z = x+jy)$ un point de $\mathcal{D}$ alors : $z - z_M = \lambda \vec{u}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$. Puis $x+jy-1-2j = \lambda(1-j)$ donc par identification partie réelle et imaginaire de l'équation, on a $x = 1+\lambda$ et $y = 2-\lambda$, et en substituant : $y = 3-x$.
2. Cette fois, $\vec{MM'}$ est orthogonal à $\vec{u}$, donc $\left\langle \vec{MM'}, \vec{u} \right\rangle = 0$. Or $\vec{MM'}(x-1, y-2)$ donc $x-1-y+2 = 0$ soit $y = x+1$
3. Idem question 1 avec $\vec{u} = \vec{MN}$ vecteur directeur.

□

T.92

Exercice 56. *Équation de droite* : Déterminer les équations des droites :

1. passant par les points $A(1,2)$ et $B(-1,0)$; (solution : $x - y + 1 = 0$) ;
2. passant par $M(1,1)$ et de vecteur normal $\vec{u}(1,2)$; (solution : $x + 2y - 3 = 0$)
3. passant par $M(1,1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(1,2)$; (solution : $2x - y - 1 = 0$) ;
4. médiatrice du segment $[AB]$ avec $A(1,2)$ et $B(-1,0)$ (rappel : la médiatrice de $[AB]$ est la droite orthogonale à la droite (AB) passant par le milieu du segment $[AB]$) ;
5. passant par $A(1,2)$ et perpendiculaire à la droite (AB) avec $B(-1,0)$.

Correction : $\mathcal{D}_4$ d'équation $x + y - 1 = 0$; $\mathcal{D}_5$ d'équation $x + y - 3 = 0$. □

T.93

Exercice 57. *Équations de droite dans le plan* : Soient $M_1(x_1, y_1)$ et $M_2(x_2, y_2)$ deux points du plan et soit $\vec{u}(\alpha, \beta)$ un vecteur. Déterminer l'équation de la droite :

1. passant par M_1 et de vecteur directeur $\vec{u}$;
2. passant par M_1 et de vecteur normal $\vec{u}$;
3. passant par M_1 et M_2 ;
4. médiatrice du segment $[M_1 M_2]$;
5. passant par M_1 et perpendiculaire à la droite $(M_1 M_2)$.

Correction :

1. $\beta(x-x_1)-\alpha(y-y_1)=0$;
2. $\alpha(x-x_1)+\beta(y-y_1)=0$;
3. $(y_2-y_1)(x-x_1)-(x_2-x_1)(y-y_1)=0$;
4. $(x_2-x_1)(x-(x_1+x_2)/2)+(y_2-y_1)(y-(y_1+y_2)/2)=0$;
5. $(x_2-x_1)(x-x_1)+(y_2-y_1)(y-y_1)=0$.

□

T.94

Exercice 58. *Droites dans le plan* : Soient $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ deux droites d'équations cartésiennes respectives $ax+by+c=0$ et $a'x+b'y+c'=0$ et soit $P(x_P,y_P)$ un point du plan.

1. À quelle condition $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont-elles parallèles ?
2. À quelle condition $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont-elles orthogonales ?
3. Quelle est la distance de P à la droite $\mathcal{D}$?

Correction :

1. $aa'+bb'=0$;
2. $ab'-a'b=0$;
3. Soit $H(x,y)$ la projection orthogonale de $P(x_0,y_0)$ sur $\mathcal{D}$. La distance recherchée vaut $d=\|\overrightarrow{HP}\|=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$ et $ax+by+c=0$ puisque H est un point de $\mathcal{D}$. On sait par ailleurs que $\overrightarrow{HP}$ est colinéaire au vecteur (a,b) : $\overrightarrow{HP}=(\lambda a,\lambda b)$. D'où $x=x_0+\lambda a$ et $y=y_0+\lambda b$ et $a(x_0+\lambda a)+b(y_0+\lambda b)+c=0$. Ainsi, $\lambda=-\dfrac{ax_0+by_0+c}{a^2+b^2}$ et $d=\sqrt{\lambda^2(a^2+b^2)}$, soit $d=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

□

Exercice 59. *Lieu géométrique* : Déterminer l'ensemble des affixes satisfaisant les relations :

1 $\mathrm{Im}(z) > 1$ 2 $\mathrm{Re}(z) \geq \frac{1}{2}$ 3 $0 \leq \arg(z) \leq \frac{\pi}{4}$ 4 $|2z-3| > 3$

Correction :

1. demi-plan au dessus de la droite d'équation $y = 1$, droite exclue
2. demi-plan à droite de la droite d'équation $x = 1/2$, droite incluse
3. portion du plan délimitée par les droites d'équation $y = 0$ et $y = x$
4. extérieur du cercle de centre $M(3/2,0)$ et de rayon $3/2$

□

T.95

3.5 Application à la trigonométrie

Théorème 48 (Formules d'Euler). *Soit* $\theta \in \mathbb{R}$. *Alors :* $\cos\theta = \dfrac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2}$ *et* $\sin\theta = \dfrac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j}$

Exercice 60. *Linéarisation de* $\sin^2(x)$:

1. Montrer que $\sin^2(x) = \dfrac{e^{2jx}+e^{-2jx}-2}{-4}$ en utilisant une formule d'Euler ;
2. En déduire que $\sin^2(x) = \dfrac{1-\cos(2x)}{2}$.

□

Exercice 61. *Linéarisation d'expressions trigonométriques* :
En s'inspirant de l'exercice précédent, linéariser les expressions suivantes :

1 $s_1(t) = \cos^2(t)$ 2 $s_2(t) = \cos^3(t)$
3 $s_3(t) = \cos(t)\sin(t)$ 4 $s_4(t) = \sin^3(t)$
5 $s_5(t) = \cos^2(t)\sin(t)$ 6 $s_6(t) = \cos(t)\sin^2(t)$

□

T.96

Théorème 49 (Formule de Moivre). *Soient* $\theta \in \mathbb{R}$ *et* $n \in \mathbb{Z}$. *Alors* $(\cos\theta + j\sin\theta)^n = \cos n\theta + j\sin n\theta$

Exercice 62. *Factorisation de* $\cos(2x)$ *et* $\sin(2x)$:

1. Développer l'expression $(\cos(x)+j\sin(x))^2$;
2. En déduire que $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$ et $\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$ en utilisant le formule de Moivre.

□

Exercice 63. *Factorisation d'expressions trigonométriques* :
En s'inspirant de l'exercice précédent, factoriser les expressions suivantes :

1 $s_1(t) = \cos(3t)$ 2 $s_2(t) = \sin(3t)$
3 $s_3(t) = \cos(4t)$ 4 $s_4(t) = \sin(4t)$

□

T.97

3.6 Racines complexes

Problème
Soit $z_0 = x_0 + jy_0 = r_0 e^{j\theta_0}$ avec x_0, y_0, r_0 et θ_0, la partie réelle, la partie imaginaire, le module et l'argument de $z_0 \in \mathbb{C}$, respectivement. On cherche à résoudre l'équation :

$$z^2 = z_0, \text{ avec } z \in \mathbb{C}$$

Exercice 64. *Racines carrées complexes* : Calculer les racines carrées complexes des nombres complexes suivants (on donnera la réponse sous forme cartésienne et sous forme exponentielle) :
1 $z_0 = j$ 2 $z_1 = 1 + j$ 3 $z_1 = e^{j\frac{\pi}{4}}$ 4 $z_2 = 2\exp(j\frac{\pi}{6})$ □

Exercice 65. *Résolution d'équation* : Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 = \sqrt{3} + j$, en déduire l'expression exacte de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Correction : $z = \pm\sqrt{2}\exp(j\pi/12)$ d'où $\cos(\pi/12) = \sqrt{\frac{1+\sqrt{3}/2}{2}}$ et $\sin(\pi/12) = \sqrt{1 - \frac{1+\sqrt{3}/2}{2}}$ □

T.98

Théorème 50 (racines complexes d'un polynôme du second degré à coefficients réels)**.** *Soient, a, b et c trois nombres réels, avec $a \neq 0$. si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ possède deux solutions complexes conjuguées $x_1 = \frac{-b - j\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $x_2 = x_1^* = \frac{-b + j\sqrt{-\Delta}}{2a}$.*

Exercice 66. *Racines* : Déterminer les solutions, éventuellement complexes, des équations :
1. $x^2 + x + 1 = 0$;
2. $x^2 - x + 1 = 0$;
3. $2x^2 + 2x + 1 = 0$;
4. $x^2 + 1 = 0$;
5. $x^4 - x^2 - 2 = 0$.

Correction :
1. $x_1 = \frac{1-j\sqrt{3}}{2}$, $x_2 = \frac{1+j\sqrt{3}}{2}$;
2. $x_1 = \frac{-1-j\sqrt{3}}{2}$, $x_2 = \frac{-1+j\sqrt{3}}{2}$;
3. $x_1 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j$, $x_2 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j$;
4. $x_1 = -j$, $x_2 = j$;
5. $x_1 = -\sqrt{2}$, $x_2 = \sqrt{2}$, $x_3 = -j$, $x_4 = j$.

□

T.99

Théorème 51. *Racines complexes d'un polynôme du second degré à coefficients complexes Soient, a, b et c trois nombres complexes, avec $a \neq 0$. L'équation $az^2 + bz + c = 0$ possède deux solutions $z_1 = \frac{-b-\delta}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b+\delta}{2a}$ avec δ une racine carrée complexe de $\Delta = b^2 - 4ac$.*

Exercice 67. *Racines d'un polynôme du second degré à coefficients complexes* : Résoudre l'équation $x^2 - (1 + j)x + j = 0$. □

T.100

Exercice 68. *Résolution d'équation* : Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2-(8+6j)z+15+30j=0$, la méthode de résolution des équations du second degré à coefficients réels restant valable pour les coefficients complexes.
Correction : Le discriminant est $\Delta=(8+6j)^2-4(15+30j)=-8(4+3j)$. Pour calculer δ tel que $\delta^2=\Delta$, on pose $\delta=x+jy$. Donc $\delta^2=x^2-y^2+2jxy=-8(4+3j)$. En ajoutant la donnée que $|\delta|^2=|\Delta|$, on en déduit le système d'équation : $\begin{cases} x^2-y^2=-32 \\ 2xy=-24 \\ x^2+y^2=40 \end{cases}$. On peut alors trouver que δ, puis que les solutions sont : $z_1=3+6j$ et $z_2=5$. □

Exercice 69. *Résolution d'équation* : Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations :

1 $z^5+1-j=0$ 2 $z^5-(-1+j)^{-1}=0$

Correction :

- 1 En posant $z=re^{j\theta}$ et en écrivant $-1+j$ sous la forme $\sqrt{2}\exp(j\frac{3\pi}{4})$, on déduit que $z=2^{1/10}\exp(j(3\pi/20+2k\pi/5))$, $k\in\{0,1,2,3,4\}$
- 2 $z=2^{-1/10}\exp(j(-3\pi/20+2k\pi/5))$, $k\in\{0,1,2,3,4\}$

□

T.101

Problème
Chercher les racines énièmes de l'unité, c'est chercher les complexes z tels que $z^n=1$.

Théorème 52 (Racine énième de l'unité). *En posant $z=r.\exp(j\theta)$, on a : z est solution du problème ssi $r=1$ et $\theta=\dfrac{2k\pi}{n}$ avec $k\in\mathbb{Z}$. Il y a donc n solutions $z_k=e^{j\frac{2k\pi}{n}}$ avec $k\in\{0,\dots,n-1\}$.*

Démonstration. Il suffit d'égaler les modules et arguments de z et de 1. □

T.102

Définition 53 (Racines énièmes d'un nombre complexe). Soient $z_0\in\mathbb{C}$ et $n\in\mathbb{N}^*$. Les racines énièmes de z_0 sont les nombres complexes z solutions de l'équations $z^n=z_0$.

Théorème 54 (Racines énièmes d'un nombre complexe). *Les racines énièmes du nombre compelxe $z_0=\rho\exp(j\varphi)$ sont les n nombres complexes $z_k=\sqrt[n]{\rho}\exp\left(j\dfrac{\varphi+2k\pi}{n}\right)$ avec $k\in\{0,\dots,n-1\}$.*

T.103

Exercice 70. *Racines énièmes* :

1. Donner les racines cinquièmes de l'unité.
2. Donner les racines cubiques de -1.
3. Calculer les racines :

1 $5^{\text{ièmes}}$ de 1 2 $4^{\text{ièmes}}$ de -1 3 cubiques de j
4 carrées de $-j$ 5 $5^{\text{ièmes}}$ de $1+j$ 6 $5^{\text{ièmes}}$ de $\sqrt{3}+j$

Réponses : 1 $\omega_k=\exp(j\frac{2k\pi}{5})$, avec $0\le k\le 4$; 2 $\omega_k=\exp(j\frac{(2k+1)\pi}{4})$, avec $0\le k\le 3$; 3 $\omega_k=\exp(j\frac{(2k+1/2)\pi}{3})$, avec $0\le k\le 2$

Correction :

4. $\omega_k = e^{-j(\frac{\pi}{4}+k\pi)}$ avec $0 \leq k \leq 1$
5. $\omega_k = \sqrt[5]{\sqrt{2}}e^{j\frac{(8k+1)\pi}{20}}$ avec $0 \leq k \leq 4$
6. $\omega_k = \sqrt[5]{2}e^{j\frac{(12k+1)\pi}{30}}$ avec $0 \leq k \leq 4$

□

T.104

Exercice 71. *Résolution d'équations* : Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $(1+z)^n = (1-z)^n$
2. $z^5 + 1 - j = 0$
3. $z^5 - (-1+j)^{-1} = 0$
4. $1 + z + z^2 + \cdots + z^n = 0$

Correction :

1. Il suffit d'écrire $\left(\frac{1+z}{1-z}\right)^n = 1$ puis de chercher les racines n-ième de l'unité et déduire z avec Euler. Finalement : $\omega_k = j\tan\frac{k\pi}{n}$ avec $0 \leq k \leq n-1$ si $n \equiv 1[\text{mod } 2]$, $k \in [\![0; n-1]\!] \setminus \{\frac{n}{2}\}$ sinon ($0 \leq k < n/2$ ou $n/2 < k \leq n-1$).
2. $\omega_k = \sqrt[5]{\sqrt{2}}e^{j\frac{(8k+3)\pi}{20}}$ avec $0 \leq k \leq 4$
3. $\omega_k = \sqrt[5]{\sqrt{2}}e^{j\frac{(8k-3)\pi}{20}}$ avec $0 \leq k \leq 4$
4. $\omega_k = e^{j\frac{2k\pi}{n+1}}$ avec $1 \leq k \leq n$

□

T.105

3.7 Application à l'électricité

Dans un problème d'électricité, on a généralement affaire à :

- une tension : $u(t) = U_0\cos(\omega t + \varphi_u) = \text{Re}\{U_0 e^{j\varphi_u} e^{j\omega t}\}$
- une intensité : $i(t) = I_0\cos(\omega t + \varphi_i) = \text{Re}\{I_0 e^{j\varphi_i} e^{j\omega t}\}$

En utilisant les complexes, on peut définir :

- Tension/intensité complexe $\underline{U} = U_0 e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I} = I_0 e^{j\varphi_i}$ amplitudes complexes de la tension et de l'intensité
- impédance complexe : $Z = \dfrac{\underline{U}}{\underline{I}} = R + jX$ avec R la résistance et X la réactance
- bobine, inductance L : $u = L\dfrac{di}{dt} \Rightarrow u(t) = -L\omega I_0\sin(\omega t + \varphi_i)$ et $\underline{U} = Z\underline{I}$ avec $Z = jL\omega$
- condensateur, capacité C : $i = C\dfrac{du}{dt} \Rightarrow i(t) = -C\omega U_0\sin(\omega t + \varphi_u)$ et $\underline{U} = Z\underline{I}$ avec $Z = \dfrac{1}{jC\omega}$

T.106